

Cal tindre en compte una sèrie de mesures preventives:

- Elimineu els objectes de rebuig on puga acumular-se aigua de pluja.
- Buideu dos vegades per setmana els recipients exteriors que pugen acumular aigua: joguets, cendrers, plats dels testos, pitxers, poals, plats d'animals domèstics, piscines de plàstic, etc.
- Cobriu amb tela mosquitera (malla de 2 mm màxim) les cisternes i els bidons oberts.
- Buideu dos vegades per setmana o tapeu amb tela mosquitera les piques i les basses xicotetes.
- Les canals de recol·lecció d'aigües de les teulades s'han de mantindre netes de restes vegetals.
- Eviteu acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desaigües.
- Eviteu els forats i les depressions de terra on es puga acumular aigua i tapeu els forats dels troncs dels arbres amb arena.
- En basses, estanys i piscines és necessari actuar de manera que l'aigua que continguen no es convertisca en un focus de cria de mosquits. Quan estiguen buides s'han de mantindre completament seques. En cas de piscines plenes d'aigua, s'han de tractar degudament.

Seguint estos consells, i amb la col·laboració de la ciutadania, podrem minimitzar els problemes ocasionats pels mosquits

Per a més informació podeu telefonar al Departament de Sanitat de Sagunt:

96 265 58 95

96 265 58 58- Ext. 6846-6847-6850

També podeu contactar amb Rentokil Initial:
900 811 007



Ayuntamiento
de Sagunto

**Rentokil
Initial**

Més informació:




<http://cuidatecv.es/pubs/mosquito-tigre-2/>

**CONSELLS PRÀCTICS
PER A PREVINDRE EL
MOSQUIT TIGRE
(*Aedes albopictus*)**



“La prevenció és el millor mètode per al control del mosquit tigre”

El cicle biològic presenta les fases d'ou, larva, pupa i adult. Les fases immadures són aquàtiques (larva i pupa), mentre que l'adult és la fase aèria.



El seu hàbitat larvari original són forats plens d'aigua en l'interior dels tronc d'arbres de les selves del sud-est asiàtic, però s'adapta molt bé a qualsevol cavitat natural, així com a recipients artificials com bidons, llavadors, plats de testos, pneumàtics vells o altres tipus de recipients.



El mosquit adult té una grandària entre 2-10 mm i es reconeix per les ratlles blanques en el cap, cos i potes.



És actiu de dia, i principalment en l'exterior de les cases on es refugia en àrees d'ombra. Volen fins als 400 metres des del lloc de cria.

Les femelles produeixen molèsties a causa de les nombroses picadures que fan.



L'interès sanitari d'esta espècie és la possibilitat de ser un potencial transmissor (vector) de malalties infeccioses, algunes víriques com el dengue o la febra chikungunya. Si bé fins ara esta possibilitat és molt baixa al nostre país, hem de considerar-la per precaució.



Tenint en compte que el mosquit tigre realitza la posta d'ous en qualsevol lloc de xicotetes dimensions susceptible de quedar inundat i que continga aigua durant uns dies, les mesures d'actuació s'han de centrar, en primer lloc, a localitzar tots estos punts o zones de cria dels mosquits.

Una vegada localitzats, les mesures se centraran a eliminar tots els elements o punts de risc possibles.